

Amino Potasio

Fertilizante Foliar



Nombre Comercial
Nutrafeed® Amino Potasio
Nombre Químico
Potasio complejado con aminoácidos
Grado
Agrícola

DESCRIPCIÓN

Nutrafeed® Amino Potasio es un corrector foliar con una elevada concentración de potasio, que contiene L-aminoácidos, lo que aumenta la eficacia en la absorción y translocación en la planta. El potasio es un macronutriente que aumenta la resistencia de la planta y potencia su sistema radicular.

Favorece la producción de glucosa e hidratos de carbono, indispensables para el desarrollo del cultivo.

La aplicación de amino potasio, actúa como corrector de carencias fisiológicas de potasio:

- Mejora la resistencia a situaciones de estrés (Heladas, sequías, etc.)
- Incrementa el calibre, color, y contenido en azúcares de los frutos.
- Incrementa la firmeza de tejidos y optimiza el crecimiento de raíces y brotes nuevos.

ANÁLISIS QUÍMICO

Potasio (K₂O)
120g/L (12 % K ₂ O p/v)
L-α aminoácidos
80 g/L (8,0 % L-aminoácidos p/v)

ANÁLISIS FÍSICO

Apariencia
Líquido Café
Densidad
A 20°C 1,2 - 1,3 gr/cc
pH
4,0 a 5,0
Toxicidad
Moderadamente tóxico, no inflamable, no corrosivo y no peligroso

RECOMENDACIONES DE USO NUTRAFEED® AMINO POTASIO

Cultivo	Dosis l/ha	Dosis cc/ha	Época de aplicación
Vid de mesa y Vinífera,	3 - 4	200 - 300	Aplicar en brotación y desde llenado de fruto. 3 a 4 aplicaciones por temporada.
Cerezo, Nectarino, Durazno y Ciruelo	3 - 4	200 - 300	Aplicar desde inicio de viraje de color en adelante
Pomáceas, Kiwi	3 - 4	200 - 300	Inicio de cambio de color del fruto
Nogal, Almendro y Avellano	3 - 4	200 - 300	Aplicar desde octubre a diciembre cada 7 a 10 días
Frutilla, Frambueso, Arándano, Mora	3 - 4	200 - 300	Aplicar desde inicio de quiebre de color a pre cosecha.
Palto, Olivo y Cítricos	3 - 4	200 - 300	Aplicar en floración y en crecimiento de brotes de otoño
Coliflor - Brócoli	2 - 3	200 - 500	30 a 40 días después de trasplante
Tomate, Pimentón	2 - 3	200 - 500	Aplicar desde el cuaje del primer racimo (cada 7 a 10 días)
Melón, Sandía, Zapallo	2 - 3	200 - 500	Aplicar desde cuaja de frutos cada 7 a 10 días.
Papa	2 - 3	200 - 500	Aplicar desde floración hasta llenado de tubérculos.