

Terrafeed Green

Fertirriego



Nombre Comercial
Terrafeed® Green
Nombre Químico
Quelato de Hierro, Cinc y Manganeseo
Grado
Agrícola

ANÁLISIS QUÍMICO

Cinc (Zn)
30 g/L (3 % Zn p/v)
Manganeseo (mn)
60 g/L (6 % Mn p/v)
Hierro (Fe)
30 g/L (3 % Fe p/v)

ANÁLISIS FÍSICO

Apariencia
Líquido Café
Densidad (20°C) g/L
1200 - 1300
pH directo
3,0 a 4,0
Toxicidad
Moderadamente tóxico, no inflamable, no corrosivo y no peligroso

DESCRIPCIÓN

Terrafeed® Green es un fertilizante líquido de aplicación edáfica, basado en Hierro, Cinc y Manganeseo quelatados con ácidos polihidrocarboxílicos y ácidos lignosulfónicos, mejora la absorción y el transporte del Hierro en la planta en situaciones de deficiencia. NO ES FOTOSENSIBLE.

RECOMENDACIONES DE USO TERRAFEEED® GREEN

Cultivo	Dosis l/ha	Época de aplicación
Pomáceas y Kiwi	2 - 3	Aplicar entre primavera e inicio de verano, con inicio de flush de crecimiento radicular, cada 8 a 12 días. Post cosecha.
Vid de mesa/ vid vinífera	2 - 3	Aplicar entre primavera e inicio de verano, con inicio de flush de crecimiento radicular, cada 8 a 12 días. Post cosecha.
Cerezos, duraznos, nectarines y ciruelos.	2 - 3	Aplicar entre primavera e inicio de verano, con inicio de flush de crecimiento radicular, cada 8 a 12 días. Post cosecha.
Limón, naranja, mandarina, palto, olivo, nogal, almendro, avellano.	3 - 5	Aplicar en primavera y otoño en peaks de crecimiento de brotes. Cada 8 a 10 días.
Frambuesa, arándano	2 - 3	Aplicar entre primavera e inicio de verano, con inicio de flush de crecimiento radical, cada 8 a 12 días. Post cosecha.
Tomate, pimentón	2 - 3	Aplicar durante el crecimiento vegetativo. En cultivos de semilla aplicar previo a floración cada 10 - 12 días.
Lechuga, apio, espinacas, repollo, hortalizas de hojas	2 - 3	Aplicar durante el crecimiento vegetativo. En cultivos de semilla aplicar previo a floración cada 10 - 12 días.
Flores	2 - 3	Aplicar en inicio de temporada, antes de floración.
Papa	4 - 5	Aplicar durante el crecimiento vegetativo. En cultivos de semilla aplicar previo a floración cada 10 - 12 días. Mejorando la calidad de la hoja.
Otros cultivos (cereales, industriales, etc.)	6 - 8	Aplicar durante el crecimiento vegetativo. En cultivos de semilla aplicar previo a floración cada 10 - 12 días.