

# Top Magnesio

Fertilizante Foliar



Nombre Comercial
Nutrafeed® Top Magnesio
Nombre Químico
Acomplejado de Magnesio
Grado
Agrícola

## ANÁLISIS QUÍMICO

Magnesio (MgO)
8 % MgO p/v
Complejado con ácidos carboxílicos.

## ANÁLISIS FÍSICO

Apariencia
Líquido Verdoso
Densidad
A 20°C 1200 - 1300 g/cc
pH
4,5 a 5,5
Toxicidad
Moderadamente tóxico, no inflamable, no corrosivo y no peligroso

## DESCRIPCIÓN

**Nutrafeed® Top Magnesio** está diseñado para prevenir y corregir deficiencias transitorias, disminuyendo desórdenes asociados a deficiencia de Magnesio y favoreciendo los procesos fisiológicos en los que participa; componente central de la clorofila, elemento fundamental en el ciclo del nitrógeno, transporte de azúcares, síntesis de proteínas entre otras.

**Nutrafeed® Top Magnesio** es un fertilizante foliar complejado con azúcares alcohol lo que permite una alta absorción y translocación del nutriente al interior de la planta. Además contiene surfactantes que mejoran la compatibilidad con fitosanitarios y logran un mejor mojamiento de las superficies asperjadas.

## RECOMENDACIONES DE USO NUTRAFEED® TOP MAGNESIO

Cultivo	Dosis l/há	Dosis cc/hl	Época de aplicación
Vid de mesa y Vinífera,	2 - 4	200 - 300	Aplicar desde brotación, inicio de floración, cuajado y desarrollo de fruto.
Cerezo, Nectarino y Ciruelo	2 - 4	200 - 300	Aplicar desde caída de pétalos y en poscosecha.
Pomáceas, Kiwi	2 - 4	200 - 300	Aplicar desde fruto cuajado en adelante.
Nogal, Almendro y Avellano	2 - 4	200 - 300	Aplicar desde octubre a diciembre cada 7 a 10 días.
Palto y Cítricos	2 - 4	200 - 300	Aplicar en floración y en crecimiento de brotes de primavera y otoño.
Frutilla, Frambueso, Arándano, Mora	2 - 3	300 - 500	Aplicar desde inicio de cuaje de frutos, cada 7 a 10 días, hasta inicio de cosecha.
Hortalizas de hojas	2 - 3	300 - 500	Aplicar 15, 30 y 45 días post trasplante.
Coliflor - Brócoli	2 - 3	300 - 500	Aplicar con 8 a 10 hojas formadas, repitiendo a los 7 a 10 días.
Tomate, Pimentón, Melón, Sandía, Zapallo	2 - 3	300 - 500	Desde inicio de cuaje de frutos cada 7 a 10 días.
Papas	2 - 3	300 - 500	Aplicar desde pre - cierre de hileras, repitiendo 7 y 15 días después.